Regione
Lombardia

ASL Brescia

Rapporto sullo stato di salute della popolazione
bresciana ed in particolare dei Distretti Socio
Sanitari N.10 e N.3

Osservatorio Epidemiologico

- 1. INTRODUZIONE SULLO STATO DI SALUTE**
- 2. IMPATTO SULLA SALUTE DELLE DISCARICHE
(INQUINAMENTO AMBIENTALE)**
- 3. MONITORAGGIO e VALUTAZIONE SANITARIA SU
PROBLEMATICHE SPECIFICHE**
- 4. POSSIBILITA' FUTURE**

CONTINUO e PROGRESSIVO INNALZAMENTO DELLA SOPRAVVIVENZA:

Età media di morte 2000-2013

Da 79,6 a 82,7 anni= **+3,1**

Da 71,0 a 75,8 anni= **+4,8**

???

Cerebro-Cardio Vascolare

Trend e territorio: maschi

Mortalità 2000-04

Mortalità 2005-9

Mortalità 2010-13

Trend e territorio: donne

LIMITE: salute non è solo sopravvivere

Ci si ammala di più?

AUMENTO DELLA DISABILITA'

In Italia nel 1990 la percentuale di anni di disabilità sul totale dei DAILYs (“anni vissuti con disabilità”+ “anni persi per morte premature”) era pari al 45% nel 2010 ha raggiunto il 52%.

Discariche e salute: quale evidenza?

<http://www.epidemiologia.it/?q=node/273>

Associazione Italiana di Epidemiologia

Aggiorn:06/05/2008

- **Gli studi fatti hanno molti limiti**
- **Bisogna considerare l'esposizione specifica (urbani? Tossici-nocivi? Componenti specifici)**
- **Via d'esposizione**
- **Trovato un eccesso di rischio per malformazioni congenite di circa il 10% in relazione a discariche di rifiuti tossico-nocivi e un maggior rischio di basso peso alla nascita (RR tra 1.03 e 1.06).**
- **«Non vi sono, invece, evidenze convincenti di eccesso di rischio per tumori, soprattutto per l'impossibilità di controllare i fenomeni migratori della popolazione esposta e la sequenza temporale fra esposizione e malattia»**

Associazione Italiana di Epidemiologia

«Le conoscenze epidemiologiche ad oggi disponibili, ancorché non conclusive, fanno ritenere che il conferimento in discariche controllate, costruite e condotte in accordo alla normativa nazionale e comunitaria, non comporti un rischio per l'ambiente e per la salute delle popolazioni insediate nelle vicinanze dello stabilimento»

Associazione Italiana di Epidemiologia

«I dati di letteratura, anche in questo caso non sufficienti e non conclusivi, mostrano che i maggiori rischi per la salute sono associati alle emissioni da discariche illegalmente utilizzate e siti di abbandono illegali, da impianti d'incenerimento con tecnologie obsolete, da siti di abbandono e dalle combustioni incontrollate di rifiuti»

Health effects associated with the disposal of solid waste in landfills and incinerators in populations living in surrounding areas: a systematic review

Int J Public Health (2013) 58:725–735

DOI 10.1007/s00038-013-0496-8

29 studi esaminati

Table 2 Evaluation of the evidence according to IARC criteria for evaluated diseases

Health effect	Level of evidence	
	Landfills	Incinerators
All cancers	Inadequate	Limited
Stomach	Inadequate	Inadequate
Colorectal	Inadequate	Inadequate
Liver	Inadequate	Inadequate
Larynx	Inadequate	Inadequate
Lung	Inadequate	Inadequate
Soft tissues sarcoma	Inadequate	Limited
Kidney	Inadequate	Inadequate
Bladder	Inadequate	Inadequate
Lymphomas	Inadequate	Inadequate
Leukemia	Inadequate	Inadequate
Brain	Inadequate	Inadequate
Children's cancers	Inadequate	Inadequate
Other cancers	Inadequate	Inadequate
All birth defects and reproductive disorders	Limited	Limited
Neural tube defects	Limited	Inadequate
Orofacial defects	Inadequate	Limited
Genitourinary tract defects	Limited	Limited
Abdominal wall defects	Inadequate	Inadequate
Gastrointestinal defects	Inadequate	Inadequate
Cardiac defects	Inadequate	Inadequate
Low birth weight	Limited	Inadequate
Respiratory diseases or symptoms	Limited ^a	Inadequate
Cardiovascular diseases	Inadequate	Inadequate
Skin diseases	Inadequate	Inadequate

^a Data confined to industrial waste

Review

Open Access

Systematic review of epidemiological studies on health effects associated with management of solid waste

Daniela Porta¹, Simona Milani¹, Antonio I Lazzarino^{1,2}, Carlo A Perucci¹ and Francesco Forastiere*¹

Table 2: Relative risk estimates for community exposure to landfills and incinerators

Health effect	Distance from the source	Relative Risk (Confidence Interval)	Level of confidence**
Landfills			
Congenital malformations [24]			
All congenital malformations	Within 2 km	1.02 (99% CI = 1.01-1.03)	Moderate
Neural tube defects	Within 2 km	1.06 (99% CI = 1.01-1.12)	Moderate
Hypospadias and epispadias	Within 2 km	1.07 (99% CI = 1.04-1.11)	Moderate
Abdominal wall defects	Within 2 km	1.05 (99% CI = 0.94-1.16)	Moderate
Gastroschisis and exomphalos*	Within 2 km	1.18 (99% CI = 1.03-1.34)	Moderate
Low birth weight [24]			
Very low birth weight	Within 2 km	1.06 (99% CI = 1.052-1.062)	High
	Within 2 km	1.04 (99% CI = 1.03-1.06)	High

Results The most consistent result is that the risks of congenital anomalies and hospitalization due to respiratory disease are likely to be real nearby special waste landfills.

Il risultato più consistente è che il rischio di anomalie congenite ed ospedalizzazione per malattie respiratorie è probabilmente reale vicino a discariche con rifiuti speciali

From the very little information on exclusively urbanwaste depots it is reasonable to say that correct management of landfill does not increase the risk of these health effects. It

In base alle davvero scarse informazioni su discariche di soli rifiuti urbani è ragionevole affermare che la corretta gestione delle discariche non aumenta il rischio di questi effetti sulla salute.

A meta-analysis of mortality data in Italian contaminated sites with industrial waste landfills or illegal dumps

Lucia Fazzo^(a), Fabrizio Minichilli^(b), Roberta Pirastu^(c), Mirella Bellino^(a),
Fabrizio Falleni^(a), Pietro Comba^(a) and Fabrizio Bianchi^(b)

NEI 10 siti con rifiuti industriali legali l'unico eccesso di mortalità significativo è stato trovato nelle donne per il tumore del rene +16%

NEI 14 siti con depositi illegali di rifiuti si notavano eccessi per
T. Fegato (entrambi i sessi)
T. Vescica (entrambi i sessi)
T. Polmone (uomini)
Cirrosi (donne)

NULLA SU MORTALITA' PER MALFORMAZIONI

Conclusion. The results are consistent with the hypothesis of adverse health effects of non-adequately managed hazardous waste. Causal interpretation is not allowed, but the meta-analytic approach provides more confidence in the findings.

I risultati sono consistenti con l'ipotesi di avversi effetti sanitari da discariche non adeguatamente gestite. Il nesso causa effetto non è permesso ma l'approccio meta-analitico aggiunge confidenza ai risultati

???

DATI

- **Malformazioni e basso peso**
- **Tumori E AMBIENTE (Fegato, Rene e Vescica)**
- **Tumori Bambini**

TUMORI

IMPATTO!

CAUSE DI MORTE ASL NEL 2013

9.774 deceduti

CAUSE DI MORTE NEL 2013

36.599 anni di vita persi

anni di vita persi

23.505 (68%)

13.094

TUMORI

MORTALITA'
+12% maschi e +6% donne
rispetto a media nazionale

Confronti esterni mortalità

	maschi		femmine	
	italia	lombardia	italia	lombardia
TUTTI tumori maligni	+12%	=	+6%	=
tumore stomaco	↑	=	=	=
tumore colon retto	=	=	=	=
tumore fegato	+68%	↑	↑	↑
tumore pancreas	↑	=	↑	=
tumore vie aeree	↑	=	=	↓
tumore vescica	↓	=	=	=
rene	↑↑	?	↑↑	?
tumori seno			=	↓
emolinfopoietico	=	=	=	=

MORTALITA' TUMORI:trend

TUMORI

- **circa 200 malattie molto eterogenee**
- **caratteristica comune: crescita cellulare svincolata dai normali meccanismi di controllo dell'organismo**
- **Andamenti temporali diversi**
- **Distribuzioni geografiche diverse (gradiente NORD-SUD)**
- **Letalità diversa (7% del pancreas al 96% tiroide donne)**
- **Fattori eziologici diversi (CAUSE)**

CAUSE TUMORI

interne

mutazioni genetiche,
ormoni, funzionalità
dell'apparato immunitario
e, generalmente, **non
sono modificabili**

esterne

- Ambiente (agenti infettivi, prodotti chimici, radiazioni)
- stile di vita (alimentazione, livello di attività fisica, fumo etc.)
- **sono modificabili!**

Qual è la quota di tumori evitabili?
Quali le cause?

American Association for Cancer Research – AACR Cancer Progress Report 2013.

Available at: www.cancerprogressreport.org Accessed 16/06/2014

	USA, 2013*
	%
Fattore di rischio	
Tabacco	33
Dieta	5
Sovrappeso, obesità	20
Inattività fisica	5
Abuso di bevande alcoliche	3
Fattori occupazionali	5
Infezioni	8
Radiazioni ionizzanti e esposizione a raggi UV	2
Inquinamento ambientale	2

Inquinamento ambientale=2%

?????

MEDIA

situazioni specifiche possono essere ben più gravi

Casale Monferrato

«l'assenza di evidenza non è evidenza di assenza»

GLOBAL BURDEN: Percentuale di DALYs persi

- Cancer
- Cardiovascular and circulatory diseases
- Chronic respiratory diseases

- Cirrhosis
- Digestive diseases
- Neurological disorders
- Mental and behavioural disorders
- Diabetes, urogenital, blood, and endocrine
- Musculoskeletal disorders
- Other non-communicable diseases
- HIV/AIDS and tuberculosis
- Transport injuries
- Unintentional injuries
- Intentional injuries
- War and disaster

TUMORE DEL FEGATO

- **OLTRE IL 70% dovuti a fattori noti:**
 - **HCV (virus epatite C) è il più importante**
 - **HBV (in calo a seguito di vaccinazione)**
 - **ALCOL: 1/3 di tutti i tumori nel Nord Italia**
 - **Obesità e steatosi alcolica (in aumento)**
 - **Fumo di sigaretta, aflatossine , altri**
- **Doppia incidenza nei maschi**
- **SOLO il 17% sopravvive a 5 anni**

ASL Brescia

In media 335 casi l'anno e 258 decessi

Tumore del fegato: Mortalità

La mortalità per tumori dell'ASL di Brescia è più elevata rispetto alla media nazionale e Lombarda.

Periodo 1999-2003, rispetto ai dati regionali:

- nei maschi SMR=2,01 (IC95% 1,88-2,14)
- Nelle donne SMR=2,31 (IC95% 2,09-2,54)

Periodo 2008-09, rispetto ai dati nazionali:

- nei maschi SMR=1,68 (IC95% 1,51-1,86)
- Nelle donne SMR=1,31 (IC95% 1,11-1,53)

Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994: mortalità K fegato nei maschi

Atlante della mortalità in Lombardia 1989-1994: mortalità K fegato nelle donne

Tassi incidenza per tumori del fegato in Lombardia 1999-2006

2004-06

■ maschi

■ femmine

Nord Ovest (P9)

Nord Est (P9)

Bergamo* (2007-9)

BRESCIA

Como

Cremona* (2005-7)

Mantova

Milano

Milano 1* (2007-9)

Sondrio

Varese

Veneto

TREND mortalità per tumori del fegato

-20% nei maschi

MORTALITA' 2000-06

MORTALITA' 2007-13

Dati INCIDENZA TUMORE DEL FEGATO 1999-2006

1 e 2=+50%

Non
significativo
(piccoli
numeri)

Possibili spiegazioni eziologiche

Possibili spiegazioni eziologiche

Studi analitici

Hepatology. 1997 Sep;26(3):579-84.

Hepatitis B and C virus infection, alcohol drinking, and hepatocellular carcinoma: a case-control study in Italy. Brescia HCC Study.

Rischi relativi

HBsAg= **11.4**

HCV RNA= **23.2**

heavy alcohol intake =**4.6**

Rischio attribuibile

HBsAg= **22%**

HCV RNA= **36%**

heavy alcohol intake =**45%**.

Altri Studi analitici (prof Donato)

- novel DNA virus (TT virus) infection **(NEG)**
- family history **(POS)**
- occupation in men **(POS e NEG)**
- Hepatolithiasis **(POS)**
- Fumo sigaretta
- Polimorfismi genetici
- Caffè **(Protettivo)**
- PCB **(NEG)**

TUMORE DEL RENE

- **FUMO di Sigaretta responsabile del 40% nei maschi**
- **Esposizione ad arsenico e cancerogeni chimici è fattore di rischio**
- **Obesità e sovrappeso causa un 25% dei casi**
- **Ipertensione arteriosa**
- **+70% sopravvive**

ASL Brescia

In media 230 casi l'anno e 85 decessi

confronto con registri tumore confinanti

Rene e altri organi urinari
Incidenza: TSE (Italiana), Maschi età (0-85+)

Rene e altri organi urinari
Incidenza: TSE (Italiana), Femmine età (0-85+)

TUMORE DEL RENE NEL TERRITORIO

Rilevati cluster Protettivo: -33% (P=0,03)

TUMORE DELLA VESCICA

- **FUMO di Sigaretta responsabile dei 2/3 sei casi nei maschi ed 1/3 nelle femmine: i fumatori hanno un rischio superiore del 400%-500%**
- **Esposizione ad amine aromatiche ed altri cancerogeni :25% di questi tumori causato da esposizioni lavorative**
- **+80% sopravvive a 5 anni**

ASL Brescia

In media 328 casi l'anno e 83 decessi

confronto con registri tumore confinanti

Vescica
Incidenza: TSE (Italiana), Maschi età (0-85+)

Vescica
Incidenza: TSE (Italiana), Femmine età (0-85+)

TUMORE VESCICA NEL TERRITORIO

Non rilevati
cluster
significativi

SIR VESCICA

TUMORI BAMBINI e ADOLESCENTI

- **Incidenza è aumentata del 30% dal 1988 al 2002 poi si è stabilizzata ed ha iniziato a scendere.**
- **Non si è capito il perché sia salita ne perché è scesa**
- **Non c'è trend Nord-Sud**
- **in 40 anni la sopravvivenza e' passata dal 30 all'80%**

TUMORI BAMBINI e ADOLESCENTI

ASL Brescia

- **Numero di casi visti in ospedale sembrava in aumento**
- **Revisione casi periodo 1999-2012 in collaborazione onco-ematologia**
- **565 casi (<19anni) di cui 371 (0-14 anni)**
- **Verificata residenza al momento della diagnosi**

Residenza dei pazienti presi in carico presso il centro AIEOP degli Spedali Civili di Brescia nel periodo 1999-2012

REGIONE RESIDENZA	N
LOMBARDIA	328
CAMPANIA	7
PUGLIA	4
EMILIA ROMAGNA	4
TRENTINO ALTO ADIGE	3
VENETO	2
SARDEGNA	2
TOSCANA	1
SICILIA	1
LIGURIA	1
<u>non riportata</u> (quasi tutti stranieri)	25

Provincia	N
Brescia	255
Mantova	42
Bergamo	16
Cremona	8
Varese	4
Milano	1
Como	1
Lecco	1

ASL BRESCIA=247
ASL <u>V. Camonica</u> =8

378 casi

Confronto rispetto ai dati nazionali

Tassi di tutti i tumori maligni standardizzati sulla popolazione europea (X1.000.000) nell'ASL di Brescia ed in Italia (pool AIRTUM) per sesso

		Brescia 1999-2012		Italia 2003-2008	
		tasso	IC 95%	tasso	IC 95%
0-19 anni*	femmine	179	157-202	178	170-185
	maschi	207	184-229	201	193-209
0-14 anni*	femmine	147	124-170	150	142-158
	maschi	187	162-212	178	169-187
15-19 anni	femmine	280	224-337	264	246-283
	maschi	268	216-321	274	256-294

*tassi standardizzati sulla popolazione europea

		Brescia 1999-2012		Italia 2003-2008		
		tasso	IC 95%		tasso	IC 95%
1) Leucemia	femmine	36	26-45		46	42-50
	maschi	51	40-63		50	46-55
2) Linfoma	femmine	39	29-49		35	32-39
	maschi	39	29-49		46	43-50
3) Tumori SNC	femmine	22	14-29		19	16-21
	maschi	28	20-37		22	19-24
11) Altre neoplasie epiteliali maligne e Melanoma	femmine	35	25-45		29	26-32
	maschi	22	14-29		16	14-19

Trend nel periodo

Tabella 8	1999-2003		2004-2008		2009-2012	
	<u>tasso</u>	IC95%	<u>tasso</u>	IC95%	<u>tasso</u>	IC95%
<u>femmine</u>	192	152-232	179	142-217	167	129-205
<u>maschi</u>	240	197-283	196	158-233	185	147-224

TUMORI BAMBINI e ADOLESCENTI

ASL Brescia

- **Nessun cluster statisticamente significativo è stato trovato sul territorio**
- **Inseriti anche casi da SDO 2013 e metà 2014: non cluster trovati.**

Sfide future

- 1. MALFORMAZIONI: AVERE UN REGISTRO**
- 2. ELABORARE ANALISI SULLE PATOLOGIE RESPIRATORIE:**
 - **DATI SDO,**
 - **PRONTO SOCCORSO,**
 - **FARMACI**
 - **ALTRO?**
- 3. ANALISI TERRITORIALI PIU' PRECISE E MIRATE:**
 - **Non SI PUO' FARE PESCA A STRASCICO**
 - **IL DATO COMUNALE PUO' ESSERE FUORVIANTE**

PCB e MELANOMA

SIR

0,00 - 0,70

0,71 - 0,90

0,91 - 1,10

1,11 - 1,50

1,51 - 2,70

PCB :LINFOMA NON HODGKIN

COMUNICAZIONE

complessità

incertezza

ricerca

stimolo

emotività

interessi

confronto

GRAZIE